




# BELIDAE


Curculionoidea de tamaño pequeño (2-3 mm), con cabeza triangular (♂♂ con expansiones laterales a modo de cuernos), antenas filiformes; rostro corto; palpos maxilares rígidos y cónicos; el labro oculto y las maxilas sin lacinia visible. Pronoto sin reborde lateral y élitros sin epipleura. Ventritos abdominales libres. Tarsos con 3 artejos visibles (criptotetrámeros) y el 2º tarsómero lobulado. En Canarias viven dos especies detritívoras, normalmente en cardones, tabaibas o berodes (*Kleinia neerifolia*) muertos.

## Clave de especies

- 1 Pronoto tan largo como ancho, con los lados débilmente festoneados, sin collarín en el margen anterior y sin fosetas laterales en la hembra. Ancho de la cabeza ♂ a nivel de las expansiones laterales poco mayor que el pronoto [HGPTCFL].....  
..... ***Aglycyderes setifer*** Westwood, 1864<sup>©</sup>
- Pronoto más ancho que largo, con los lados más profundamente festoneados, con collarín en el margen anterior y con fosetas laterales en la hembra. Ancho de la cabeza ♂ a nivel de las expansiones laterales generalmente mucho mayor que el pronoto (varía) [HPGT?].....  
..... ***Aglycyderes tavakiliani*** Menier, 1974



*Aglycyderes setifer*



*Aglycyderes tavakiliani*