

CERYLONIDAE

Cucujoidea de tamaño pequeño (< 3 mm), cuerpo oval u oblongo, brillante y glabro; con alas. Antena de 11 o menos artejos, con el primer desmómero inflado y maza esférica; su inserción expuesta en vista dorsal. Tarsos tetrámeros (difíciles de discernir), con el primer tarsómero lobulado o simple, y las uñas simples. Son presuntamente micófagos y se encuentra en la vegetación en descomposición, en hongos y también en nidos de hormigas. En Canarias una sola especie compartida con Azores y Madeira.

Clave de especies

- 1 Cuerpo oblongo-elíptico, muy convexo dorsalmente (aspecto de *Olibrus*). Tegumento liso, lustroso, glabro, de color castaño-rojizo (patas algo más pálidas), con punteado imperceptible. Antena de 11 artejos y maza compacta esférica de dos (uno mayor que el otro). Borde posterior del pronoto ligeramente sinuoso. Escudete muy pequeño. Prosterno aquillado a lo largo. Tibias comprimidas, dilatadas hacia el ápice y con bordes externos no dentados. Talla 2,2–2,4 mm [PGTC].....
 ***Euxestus parkii*** (Woll., 1858)
 Se ha colectado en nidos de hormigas y en excrementos en una estercolera.



Euxestus parkii