

EROTYLIDAE

Cucujoidea de tamaño moderado (3–7 mm), forma elíptica, y tegumentos glabros. Mandíbulas con la punta curvada hacia dentro. Antenas de 11 artejos con maza laxa de tres, el último redondeado. Palpos maxilares anchos, securiformes. Tarsos 4+4+4; metatarsos sin artejos lobulados, uñas simples [en otras regiones los hay con mandíbulas diferentes, antenas filiformes o con tarsos pentámeros]. Son micófagos y silvícolas. En Canarias un género endémico relacionado con la fauna africana; dos especies.

Clave de especies

- 1 Cuerpo mayor, más ancho y más elíptico; tegumento menos brillante. Pronoto trapezoidal, notablemente más ancho en la base, con lados poco arqueados. Color píceo con las extremidades y ápice elitral pardo-amarillentos. Talla 3,9–5,5 mm {T}. ***Xestus throscoides*** Woll., 1864[©]
- Cuerpo menor, más estrecho, elongado y brillante. Pronoto más cuadrangular, con lados casi paralelos en los dos tercios basales. Coloración píceo, cabeza, margen del pronoto, ápice elitral y extremidades pardo-rojizas. Élitros más comprimidos lateralmente. Talla 3,2–4,4 mm. [G] ***Xestus fungicola*** Woll., 1865[©]



Xestus throscoides



Xestus fungicola