


KATERETIDAE


Cucujoidea de pequeño tamaño (< 3 mm). Cabeza sin escrobas suboculares, aguzada por delante (muy característico); antenas de 11 artejos y maza de tres separados [2-5 compactos en Nitidulidae]. Acetábulo procoxal ligeramente cerrado por detrás. Pigidio y penúltimo segmento abdominal expuestos. Tarsos criptopentámeros (apariencia 4+4+4). Florícolas; las larvas se desarrollan sobre urticáceas. En Canarias, un género con cinco especies endémicas, salvo una.

Clave de especies


- 1 Ángulos posteriores del pronoto obtusos y algo romos, pero diferenciados2
- Ángulos posteriores del pronoto completamente redondeados3
- 2 Tegumento entre los puntos del pronoto y escudete fuertemente reticulado, mate. Protibias ♂ mucho más largas que en la hembra. Pigidio lobulado en la hembra. Sobre *Gesnouinia*. Talla 1,7–2,6 mm. [PGT]
... ***Brachypterus longimanus*** (Woll., 1864)©
- Tegumento entre los puntos del pronoto y escudete liso y brillante. Protibias ♂ poco más largas que en la hembra. Pigidio curvo en ambos sexos. Sobre *Urtica* y *Gesnouinia*. Talla 1,7–2,5 mm. [PGTC] .
.. ***Brachypterus aeneomicans*** (Woll., 1865)©
- 3 Tegumento entre los puntos de la frente simple, liso y brillante. Antenas y patas completamente amarillas o anaranjadas. Cuerpo verde o pardo oscuro, con viso metálico verdoso. Talla 1,7–2,3 mm Sobre *Forsskaolea*. [GTCFL]
.... ***Brachypterus viridinitens*** Lindb., 1950©
- Tegumento entre los puntos de la frente rugoso, granular, de apariencia mate. Antenas claras oscurecidas apicalmente (por lo común)4
- 4 Talla menor (1,3–2,0 mm); cuerpo más convexo y corto, negro o castaño, a veces con visos cobrizos; pubescencia más débil corta, dorada o plateada [FL] ... ***Brachypterus curtulus*** (Woll., 1864)
- Talla mayor (1,4–2,4 mm); cuerpo menos convexo y más esbelto, negro o pardo oscuro con visos verdosos o bronceos. Pubescencia más larga y conspicua, generalmente dorada (los pelos se solapan bastante). [HPGT]
..... ***Brachypterus velatus*** (Woll., 1863)©



B. longimanus




B. viridinitens



B. aeneomicans



B. curtulus



B. velatus

P. Audisio



Brachypterus longimanus



Brachypterus curtulus

A. Machado

G. Jacquemini