


# LAEMOPHLOEIDAE

Cucujoidea de tamaño pequeño (< 3 mm), cuerpo bastante aplanado, paralelo, con líneas careniformes sublaterales en cabeza y pronoto. Élitros atravesados por costillas longitudinales (interestrías 1, 3, 5 y 7). Antenas filiformes, moniliformes o engrosando hacia el ápice, usualmente muy largas. Tarsos no lobulados, 5+5+5 (♂♂ frecuentemente 5+5+4). Machos más cabezudos y con antenas más largas que las hembras. Especies subcorticólicas y también plaga de los granos almacenados. En Canarias dos géneros y cuatro especies; una de ellas macaronésica (*Placonotus granulatus*).

### Clave de especies

- 1 Cabeza al medio con surco longitudinal completo. Los cuatro ángulos del pronoto agudos y sobresalientes (punta diferenciada). Tegumento mate, reticulación poligonal visible entre los puntos. Color leonado a pardo-rojizo; élitros a veces con bandas oscuras; disco deprimido a ambos lados de la sutura. Pigidio expuesto.. Talla 2,5–2,75 mm [PGTC+]..... ***Placonotus granulatus*** (Woll., 1864)




- Pronoto notoriamente estrechado por detrás. Antenas ♂ hacia atrás alcanzan a lo más el primer tercio elitral, no mucho más larga que en la ♀... . . . 3
- 3 Ángulos posteriores del pronoto obtusos (ver dibujo). Élitros con tres hileras de puntos entre las costillas longitudinales. Artejo antenal 3º mucho mayor que el 4º, los tres últimos más anchos que los previos. Clípeo plano. Cuerpo pardo oscuro o negro (élitros usualmente más claros que el resto). Talla 1,8 –2,5 mm [HGPTCFL] . . . . . ***Cryptolestes capensis*** (Waltl., 1834)



- Cabeza al medio sin surco longitudinal completo. Ángulos anteriores del pronoto rectos u obtusos, sin punta diferenciada. Pigidio oculto . . . . . 2
- 2 Pronoto apenas estrechado por detrás. Élitros cortos (L/A= 1,3 ♂ - 1,5 ♀) con tres hileras de puntos entre las costillas longitudinales. Antenas ♂ muchísimo más largas que en la ♀ (pueden alcanzar el ápice elitral). Talla 1,4–1,9 mm [PTC+] . . . . . ***Cryptolestes pusillus*** (Schön.,1817)

- Ángulos posteriores del pronoto vivos, a menudo sobresalientes. Élitros con cuatro hileras de puntos entre las costillas longitudinales. Clípeo algo convexo. Cuerpo de color amarillo más o menos ferruginoso. Talla 1,9–2,3 mm [PGTL+] . . . . . ***Cryptolestes ferrugineus*** (Steph., 1831)



*Placonotus granulatus*



*Cryptolestes pusillus* ♂



*Cryptolestes capensis*



*Cryptolestes ferrugineus*