

MYCETOPHAGIDAE

Tenebrionoidea primitivos de tamaño pequeño (< 4 mm), cuerpo oval o elongado, con abundante pubescencia tumbada; por lo general, de color oscuro con dibujo anaranjado variable. Pronoto más ancho en la base que por delante. Antenas de 11 artejos con maza suelta de 3. Tarsos visibles 4+4+4, simples. Insectos micófagos, asociados a hongos arborícolas o a los desarrollados en vegetación en descomposición. En Canarias dos géneros y cuatro especies (una por confirmar).

Clave de especies

- 1 Élitros unicolores, con estrías punteadas e hileras de pelos levantados y solapados formando líneas distinguibles entre la pubescencia menor yacente. Pronoto con dos impresiones basales en el disco. Perfil del cuerpo (vista dorsal) orlado de abundante pilosidad. Color castaño uniforme. Talla 2,5–4 mm [HPGTCFL] *Typhaea stercorea* (L., 1759)
- Élitros bicolors: fondo negro o pardo con dos bandas quebradas anaranjadas transversales, una antes de la mitad, otra después; punteado embrollado, sin traza de estrías o de pelos alineados. Sin impresiones basales en el pronoto. Vértex separado de la frente por una línea muy fina. Escudete semicircular 2
- 2 Último artejo antenal cilíndrico, 1,6× más largo que el anterior. Banda anaranjada anterior abarca también la región escutelar (excepto escudete). Talla 2,0–2,4 mm [TC]..... *Litargus balteatus* Le Conte, 1856
- Último artejo antenal subglobular, aproximadamente igual de largo que ancho, y poco mayor que el previo Élitro con la región escutelar por lo común de color pardo. 3
- 2 Pronoto con puntos grandes, separados un diámetro entre sí (intervalos lisos). Último artejo antenal redondeado, 8º más ancho que el 7º (hace de transición y da apariencia de maza de cuatro). Cuerpo oblongo y más paralelo (élitros L/A= 1,5); lados del pronoto anaranjados hacia el ángulo posterior; élitros con máculas claras apicales además de las dos bandas transversales pre- y postmediana. Primer tarsómero anterior ♂ muy dilatado. Talla 2,1–2,8 mm [cita genérica] *Litargus connexus* (Geoff., 1785)
- Pronoto finamente corneolado, con microescultura en los intervalos. Élitros más ovales y cortos (L/A = 1,23–1,3). Último artejo antenal truncado. Coloración similar (pronoto y ápice elitral generalmente sin manchas anaranjadas). Talla 1,6–2 mm [HGPTCL+]..... *Litargus coloratus* Rosenh., 1856



Typhaea stercorea



Litargus balteatus



Litargus connexus

Litargus coloratus