

## SALPINGIDAE

Tenebrionoidea de tamaño pequeño (<4 mm), cuerpo elongado o cilíndrico, antenas de 11 artejos con maza de tres o engrosando hacia el ápice; tarsos 5+5+4 ó 4+4+4, con metatarsos simples. Familia difícil de caracterizar por su concepción actual plausiblemente polifilética. Las larvas y adultos son depredadores activos en ramas o cortezas, y también hay una especie ciega\* edáfica y detritívora. En Canarias dos géneros y dos especies.

### Clave de especies

- 1 Ojos semi-esféricos, prominentes. Élitros más anchos que el pronoto, algo constreñidos y deprimidos después de los hombros, máxima anchura en el tercio apical. Dorso irregular, con algunas depresiones y abultamientos, puntos muy profundos y separados; tegumento con viso dorado sobre fondo verde oscuro en cabeza y pronoto, más claro (fondo pardo) en élitros; patas y antenas rojo-ferruginosas. Antenas filiformes engrosadas y oscurecidas hacia el ápice. Tarsos 5+5+4. Talla 2,5–3,8 mm [PTC]. . . . . ***Sphaeriestes impressus*** (Woll., 1857)
- Sin ojos. Cuerpo subparalelo, bastante cilíndrico, con tegumento subopaco rojo-ferruginoso; punteado superficial. Cabeza ancha, antenas cortas, unicolores, con maza de 3 artejos. Pronoto cuadrangular. Élitros con húmeros agudos y breve constricción posthumeral. Tarsos 4+4+4. Talla 1,5–2,2 mm [HGPTCFL] . . . . . ***Aglenus brunneus*** (Gyll., 1813)



*Sphaeriestes impressus*



*Aglenus brunneus*

\**Aglenus brunneus* fue considerado un colídido (= Zopheridae) hasta recientemente y ahora constituye el sólo una subfamilia en Salpingidae. Su origen es norteamericano y ha sido introducido en muchas partes.