

SALPINGIDAE

Tenebrionoidea de tamaño pequeño (<4 mm), cuerpo elongado o cilíndrico, antenas de 11 artejos con maza de tres o engrosando hacia el ápice; tarsos 5+5+4 ó 4+4+4, con metatarsos simples. Familia difícil de caracterizar por su concepción actual plausiblemente polifilética. Las larvas y adultos son depredadores activos en ramas o cortezas, y también hay una especie ciega* edáfica y detritívora. En Canarias dos géneros y dos especies.

Clave de especies

- 1 Ojos semi-esféricos, prominentes. Élitros más anchos que el pronoto, algo constreñidos y depri-
midos después de los hombros, máxima anchura
en el tercio apical. Dorso irregular, con algunas
depresiones y abultamientos, puntos muy profun-
dos y separados; tegumento con viso dorado sobre
fondo verde oscuro en cabeza y pronoto, más claro
(fondo pardo) en élitros; patas y antenas rojo-fe-
rruginosas. Antenas filiformes engrosadas y oscu-
recidas hacia el ápice. Tarsos 5+5+4. Talla 2,5–3,8
mm [PTC]. ***Sphaeriestes impressus*** (Woll., 1857)
- Sin ojos. Cuerpo subparalelo, bastante cilíndrico,
con tegumento subopaco rojo-ferruginoso; pun-
teado superficial. Cabeza ancha, antenas cortas,
unicolores, con maza de 3 artejos. Pronoto cua-
drangular. Élitros con húmeros agudos y breve
constricción posthumeral. Tarsos 4+4+4. Talla
1,5–2,2 mm [HGPTCFL] ***Aglenus brunneus*** (Gyll., 1813)



Sphaeriestes impressus



Aglenus brunneus

**Aglenus brunneus* fue considerado un colíddido (= Zopheridae) hasta recientemente y ahora constituye el sólo una subfa-
milía en Salpingidae. Su origen es norteamericano y ha sido introducido en muchas partes.