


TROGIDAE

Scarabaeoidea de tamaño grande (7,5–15 mm), cuerpo ancho, paralelo, rechoncho, con el abdomen plano, de coloración oscura y tegumento esculpido, frecuentemente cubierto de barro. Antenas flabeladas (maza con láminas). Tarsos 5+5+5, simples. Se alimentan de restos animales (pluma, pelo, piel, etc.) y suelen habitar ambientes áridos, tanto en cadáveres ya secos, como en nidos de aves. Son atraídos a la luz. En Canarias dos géneros y tres especies de amplia repartición.

Clave de especies

- 1 Escudete estrechado en su mitad basal. Pronoto apenas más ancho que largo, con la base constreñida lateralmente y prolongada en triángulo al medio. Clípeo triangular, casi plano. Meso y metatibias sin dientes o espinas laterales. Élitros con teselas negras sobre fondo caqui. Talla 11,5–15 mm [F] ***Omorgus suberosus*** (Fab., 1775)
- Escudete ojival, no estrechado en la base. Base del pronoto normal, no constreñida, avanzada y convexa en su tercio medio. Mesotibias con dientes laterales. Coloración pardo-negruzca 2
- 2 Élitros subnítidos; diente humeral breve; estrías finas sin puntos; interestrías del mismo ancho, con protuberancias granulares aplastadas, provistas por detrás de setas cortas e inconspicuas (recuerdan una calzada de adoquines). Diente apical externo de las protibias bífido, romo. Meso y metatibias con dientes en su cara externa. Talla 7,5–11 mm [HPTFL+] ***Trox granulipennis*** Fairm., 1852
- Élitros subopacos, con diente humeral robusto; estrías anchas con puntos; interestrías impares más amplias que las pares, elevadas, con protuberancias ovales mates portando por detrás mechones de 5–6 setas amarillas largas, muy conspicuas. Diente apical externo de las protibias robusto y agudo. Metatibias sin dientes en su cara externa. Talla 9–11 mm [FL]. ***Trox hispidus*** Pontoppidan, 1763



Omorgus suberosus



Trox granulipennis



Trox hispidus