

Nuevas citas de coleópteros para Canarias (III)

¹García, R.*, ²Valle, R., ³Machado, A. & ⁴Oromí, P.

¹C/ El Pilar 8, tercero, pta. 1, 38700 SC de La Palma (SC de Tenerife)

²C/ Barquisimeto 4, portal G, 2º izq. 38206 San Cristóbal de La Laguna, Tenerife

³C/ Chopin 1, 38208 San Cristóbal de La Laguna, islas Canarias, España.

⁴Depto. Biología Animal, Edafología y Geología. Universidad de La Laguna. Tenerife

*Dirección de correspondencia: rgarbec@gmail.com

Resumen: Se aportan nuevos datos sobre la distribución insular y biología de 69 especies de coleópteros de Canarias, cuatro de las cuales son nuevas citas para la fauna del archipiélago. También se señalan 14 especies no nativas que se consideran introducciones antrópicas, tanto esporádicas como presuntamente naturalizadas en las islas, confirmándose la presencia de tres de ellas previamente citadas para Canarias sin precisar en qué islas, y un endemismo descrito hace mucho, poco conocido, que no se había vuelto a encontrar desde su descubrimiento.

Palabras clave: coleópteros, nuevas citas, islas Canarias, especies exóticas.

New records of Coleoptera from the Canary Islands (III)

Abstract: New data on the island distribution and biology of 69 species of Coleoptera from the Canary Islands are provided, four of which being new records for the archipelago. 14 non-native species considered to be anthropogenic introductions are reported, either sporadic or presumably already settled on the islands, confirming the presence of three of them previously reported for the Canaries without specifying on which islands, and a little-known endemic species described long ago, not found again since its discovery.

Key words: Coleoptera, new records, Canary Islands, exotic species.

Introducción

Este artículo es una continuación de los dos anteriores recientemente publicados por García *et al.*, (2024 y 2025), en los que se daba a conocer la presencia de especies de coleópteros hasta ahora no citadas para la fauna del archipiélago canario en su conjunto o de islas concretas, fruto de prospecciones entomológicas realizadas por los autores. Asimismo, la reciente elaboración de claves de identificación de los coleópteros canarios (Machado, 2026) ha facilitado la identificación de taxones de algunas familias complejas como los Staphylinidae. También se aportan datos de endemismos canarios que no habían vuelto a ser encontrados desde su descripción, así como de ejemplares aislados de especies foráneas presuntamente asociados a importaciones recientes sin éxito colonizador. Se pretende con ello contribuir al conocimiento de la distribución y ecología de los coleópteros presentes en el archipiélago canario, siguiendo la misma línea de estudio reflejada en anteriores trabajos (Israelson *et al.*, 1982; García, 1986, 1991, 2003, 2009; García *et al.*, 2016; Machado, 2006, 2014; Machado & Oromí, 2000; Machado & García, 2019; Oromí, 1984; Oromí & García, 1995, etcétera). Toda esta información se viene incorporando al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, con vistas al desarrollo de medidas de gestión de los recursos naturales isleños.

El material estudiado ha sido capturado e identificado por los autores, encontrándose depositado en sus respectivas colecciones particulares, salvo las excepciones indicadas en el texto. Para confirmar las novedades faunísticas se han consultado el catálogo de Oromí *et al.* (2010), el Banco del inventario natural de Canarias BIOCAN, y las bases de datos de coleópteros

de Canarias que dos de los autores (AM y PO) mantienen actualizadas. Para la distribución de las especies conocidas anteriormente y tratadas en el texto, consultar el Banco del Inventario Natural de Canarias (2026).

Resultados

Se aportan 4 primeras citas para Canarias (incluido un género); 4 para El Hierro, 17 para La Palma, 6 para La Gomera, 12 para Tenerife, 7 para Gran Canaria, 12 para Fuerteventura, 12 para Lanzarote y 1 para Montaña Clara. De las 69 especies estudiadas, 55 se consideran nativas (19 son endémicas de Canarias y 2 de la Macaronesia) y 14 exóticas. Algunas de estas últimas han llegado recientemente y se encuentran en clara expansión, pudiendo devenir en especies invasoras nocivas para la biodiversidad local, o desarrollarse como plagas con el consiguiente perjuicio económico. Una de ellas no debe considerarse como parte de la respectiva fauna local hasta conseguir nuevos registros.

Las novedades detectadas se relacionan a continuación en orden alfabético de familias y de especies. Las fotos que se adjuntan corresponden a ejemplares referenciados en el texto como primeras citas para Canarias.

ANTHICIDAE

Anthicus lubbocki Wollaston, 1857. La Palma: San Andrés y Sauces, Pico de la Cruz, 2319 m (28°45'18"N 17°51'11"O), 9 exx., 21-8-1983, leg. R. García, bajo piedras y deambulando por el suelo. Endemismo macaronésico compartido con Madeira (Borges *et al.*, 2008); en Canarias está presente en las cumbres de Tenerife y Gran Canaria. Primera cita para La Palma.

BOSTRICHIDAE

Lycius tomentosus Reitter, 1878. La Palma: S/C de La Palma, 20 m (28°41'10"N 17°45'40"O), 2 exx., 23-4-2025, leg. R. García, obtenidos de vainas de flamboyán (*Delonix regia*). Especie originaria de México y actualmente extendida por todo el neotrópico. Recientemente citada para Canarias (García *et al.*, 2024). Primera cita para La Palma.

Scobicia ficolola (Wollaston, 1865). Fuerteventura: La Oliva, Villaverde, 230 m (28°38'06"N 13°54'21"O), 1 ex., 1-8-2025, leg. R. Valle, atraído mediante trampa de luz. Primera cita para Fuerteventura de esta especie endémica.

Sinoxylon anale Lesne, 1887. Gran Canaria: Maspalomas, 28 m (27°45'33"N 15°35'25"O), 1 ex., 18-12-2024, leg. Tomasz Klejdysz, en tronco profusamente infestado. Especie cosmopolita que en muchos lugares es considerada como plaga de cuarentena. Primera cita para Canarias.

BUPRESTIDAE

Acmaeodera cisti cisti Wollaston, 1862. El Hierro: Valverde, Las Playas, 20 m (27°43'23"N 17°57'19"O), 2 exx., 4-2-2026, leg. R. Valle, eclosionan de tronco de *Rumex lunaria* recogido en noviembre de 2025. Especie endémica citada para las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, primer registro para la isla de El Hierro.

CARABIDAE

Bembidion schmidtii alluaudi (Antoine, 1925). Lanzarote: Haría, Presa de Mala, 70 m (29°06'30"N 13°28'34"O), 4 exx., 26-3-2025, y 8 exx., 6-5-2025, leg. R. García; 4 exx., 6-5-2025, leg. A. Machado, en la orilla del interior de la presa y en las escorrentías del fondo del barranco, coexistiendo con *Bembidion varium*. Especie circummediterránea con la presente subespecie distribuida por el norte de Marruecos y el sur de la península ibérica. Primera cita para Canarias.

Bembidion varium (Olivier, 1892). Lanzarote: Haría, Presa de Mala, 70 m (29°06'30"N 13°28'34"O), 1 ex., 26-3-2025 y 3 exx., 6-5-2025, leg. R. García; 1 ex., 6-5-2025, leg. A. Machado, en la orilla del interior de la presa y en las escorrentías del fondo del barranco. Especie de amplia distribución paleártica, conocida en Canarias de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Primera cita para Lanzarote.

Polyderis algericus Lucas, 1846. La Palma: Garafía, Juan Adalid, 290 m (28°50'37"N 17°54'20"O), 1 ex., 5-12-2004, leg. A. Machado, en prado arcilloso encharcado. Especie del Mediterráneo occidental conocida de Tenerife. Primera cita para La Palma.

Platytarus famini famini (Dejean, 1826). Tenerife: Granadilla de Abona, Las Maretas, 1 m (28°05'42"N 16°28'57"O), 9 exx., 25-1-2025, leg. R. Valle bajo piedras en terreno húmedo y arcilloso junto a tarajales. Especie distribuida desde el Cáucaso por la cuenca mediterránea y Sáhara occidental hasta Cabo Verde. En Canarias presente en Gran Canaria y Fuerteventura. Primera cita para Tenerife.

Metadromius pervenustus (Wollaston, 1864). Fuerteventura: Tefía, Paraje Rosa Ucala, 130 m (28°32'44"N 13°59'42"O), 1 ex., 13-10-2022, leg. R. Valle tamizaje de *Launaea arborescens*. Especie endémica distribuida por La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Primera cita para Fuerteventura.

CERAMBYCIDAE

Chlorophorus glabromaculatus glaucus (Fabricius, 1781). La Gomera: Llanadas de Arure, 920 m (28°07'44"N 17°18'47"O), 4 exx., junio 2025, *ex larva* en *Adenocarpus* sp., leg. Jan Pelikán, junto con *Acmaeodera cisti kudrnaorum* y *Anthaxia juliae*. Especie holomediterránea, extendida hacia el Cáucaso occidental, Siria y el norte de Irán. En Canarias fue citada de Tenerife solo una vez (Brullé, 1839) como *Clytus webbi* Castelnau et Gory, 1836, pero nunca se volvió a encontrar. Se confirma su presencia en Canarias y se cita por primera vez para La Gomera.

CHRYSOMELIDAE

Acanthoscelides macrophthalmus (Schaeffer, 1907). Lanzarote: Haría, Tabayesco, 58 m (29°07'33"N 13°28'33"O), numerosos ejemplares refugiados en vainas de *Leucaena leucocephala*, en las que también se encontraba el Ptinidae *Ozognathus cornutus* (Le Conte, 1859) leg. R. García; Tías, Barranco de la Fuente 70 m (28°57'14"N 13°37'40"O), 2 exx., 04-12-2024, leg. R. Valle, en semillas de aroma blanco (*L. leucocephala*). Especie cosmopolita gracias al uso ornamental y forrajero de su planta huésped. En Canarias se conocía de El Hierro, La Palma, La Gomera y Gran Canaria. Primera cita para Lanzarote. Probablemente aparecerá en las islas restantes si se busca en su planta huésped.

Aphthona wachnitzae (Madar & Madar, 1950). Lanzarote: Haría, Catalina Cabrera, 15 m (29°11'37"N 13°30'22"O), 1 ex., 27-11-2004, leg. H. López; 2 exx., 28-11-2004, leg. GIET; Haría, Caleta del Mojón, 12 m (29°12'20"N 13°25'37"O), 3 exx., 5-5-2025, leg. R. García, en flores y hojas de tabaiba (*E. lamarckii* subsp. *wildpretii*). Originaria del sur de Marruecos. En Canarias está referenciada para El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Montaña Clara. Primera cita para Lanzarote.

Bruchidius taorminensis (Blanchard, 1844). Fuerteventura: Tetir, 355 m (13°56'35"N 16°39'24"O), 2 exx., 21-3-2025, leg. R. Valle, sobre flores de compuestas. Distribución mediterránea, localizado en Canarias en El Hierro, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Primera cita para Fuerteventura.

Chrysolina americana Linnaeus, 1758. Tenerife: La Laguna, Los Baldíos, Cementerio de San Luis, 660 m (28°28'06"N 16°19'50"O), 2 exx., 16-2-2000, leg. P. Oromí, sobre plantas de *Salvia rosmarinus*. Especie circummediterránea muy probablemente introducida en Canarias, ya que está casi siempre asociada al romero, planta a su vez no autóctona. Primera cita para Canarias.

COCCINELLIDAE

Cheilomenes propinqua (Mulsant, 1850). La Palma: Santa Cruz de La Palma, Avda. los Indianos, 6 m (28°40'10"N 17°46'08"O), 2 exx., 21-10-2024, leg. R. García, depredando sobre el pulgón de la adelfa (*Aphis nerii* Boyer de Fonscolombe, 1841). Especie distribuida por África tropical y Oriente Medio y citada recientemente de la península ibérica y Canarias, donde se conocía de Tenerife y Gran Canaria. Primera cita para La Palma.

Harmonia axyridis (Pallas, 1773). La Palma: S/C de La Palma, Barranco del Carmen, 100 m (28°41'49"N 17°46'06"O), se observaron ejemplares en todas las fases (huevo, larva, pupa y adulto), 5-12-2024, leg. R. García, en una finca ecológica (Haciendita del Carmen) alimentándose de *Nipaecoccus nipae* (Maskell, 1893) (Homoptera, Pseudococcidae); Breña Alta, Camino el Brezal, 338 m (28°38'46"N 17°46'46"O), varios ejemplares, 11-12-2024, leg. J. Pedrianes, sobre chirimoya (*Annona cherimola* Mill. LC.) depredando sobre *N. nipae*. Especie originaria del sudeste asiático que ha sido introducida en numerosas regiones como controlador biológico hasta hacerla prácticamente cosmopolita. En Canarias se conocía de Tenerife y Gran Canaria. Primera cita para La Palma.

Parexochomus troberti troberti (Mulsant, 1850). Gran Canaria: Telde, La Montañeta, 41 m (27°56'30"N 15°23'40"O), 2 exx., 14-10-2025; 8 exx., 21-10-2025, leg. R. Valle, junto a *Cryptolaemus montrouzieri* Mulsant, 1853, *Hippodamia variegata* (Goeze, 1777) e *Hyperaspis vinciguerrae* Capra, 1929 leg. R. Valle, sobre *Kleinia neriifolia* Haw. infestada de cochinilla. Especie afrotropical descrita de Senegal y referenciada para las islas Canarias. Se confirma su presencia en la isla de Gran Canaria.

CURCULIONIDAE

Amaurorhinus bewickianus (Wollaston, 1860). Lanzarote: Famara, infra Fuente de Gusa, 5 m (29°13'45"N 13°28'37"O), 3 exx., 11-3-1989, leg. A. Machado, junto con *A. clermonti*. Especie distribuida por la cuenca mediterránea (Córcega, Grecia, Italia, Malta, España y Archipiélago de Madeira, norte de África, Egipto, Túnez y Asia Menor). Había sido citada de Canarias sin localidad precisa (Alonso Zarazaga, *et al.*, 2023). Se confirma su presencia en Canarias.

Hylastes attenuatus Erichson, 1836. Tenerife: Las Lagunetas, La Esperanza, El Rosario, 1432 m (28°24'52"N 16°24'43"O), 1 ex., 14-7-2003, leg. R. García, bajo corteza de pino canario; La Laguna, El Coromoto, 575 m (28°29'07"N 16°19'43"O), 1 ex., 27-1-2026, leg. R. Valle, adherido a una pared en zona urbana. Especie repartida por Europa y Asia hasta el Japón. Arved Lompe (2023) citó para Tenerife un macho sin concretar la localidad. Se confirma su presencia en Tenerife. Distribuido en La Palma, La Gomera y Tenerife.

Orthotomicus nobilis (Wollaston, 1862). Fuerteventura: Betancuria, Castillo de Lara, 470 m (28°24'44"N 14°03'01"O), 2 exx., 2-8-2025, leg. R. Valle, muertos

bajo cortezas de *Pinus canariensis* C. Sm. ex DC. Endemismo Canario citado para todas las islas excepto Fuerteventura y Lanzarote, se reporta aquí su presencia en Fuerteventura.

Otiorhynchus cribricollis Gyllenhal, 1834. Tenerife: Santa Cruz, 65 m (28°28'33"N 16°15'18"O), 4 exx., 28-11-1968, leg. A. Machado. Originario de la cuenca mediterránea, se ha extendido accidentalmente a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. En Canarias se conocía de La Gomera y Gran Canaria. Primera cita para Tenerife.

Pseudophloeophagus truncorum (Stephens, 1831). Tenerife: Anaga, Benijo, 81 m (28°34'27"N 16°11'14"O), 1 ex., 5-12-2013, leg. R. García en tamizaje; La Laguna, El Ortigal Bajo, 700 m (28°28'23"N 16°21'47"O), 3 exx., 25-6-2017; 2 exx., 15-5-2020; 9 exx., 10-10-2020, leg. R. Valle, bajo piedras, troncos y cortezas; El Ortigal, 700 m (28°28'23"N 16°21'46"O), 3 exx., 22-2-2020, leg. A. Machado, bajo tronco de *Ulmus* sp. muerto. Especie originaria de Marruecos, señalada para Canarias por Osella (1991) como *Caulotrupodes aeneopiceus* (Boh., 1845) en un listado corológico sin mayor detalle. Se confirma su presencia al menos en Tenerife.

Sibinia arenariae Stephens, 1871. Fuerteventura: Presa los Molinos, 126 m (28°30'37"N 14°01'52"O), 3 exx., 28-1-2024; Pájara, Fayagua, 190 m (28°18'32"N 14°08'56"O), 1 ex., 13-1-2020; Betancuria, Morro Velosa, 660 m (28°26'15"N 14°03'01"O), 1 ex., 27-2-2019, leg. R. García. Especie ampliamente distribuida por toda la región paleártica. En Canarias se conocía de Lanzarote. Primera cita para Fuerteventura.

Trachyploeus laticollis Boheman, 1843. El Hierro: Valverde, infra La Caldereta, 710 m (27°47'35"N 17°55'20"O), 1 ex., 19-8-2020, leg. R. Valle, tamizando hojarasca de *Asphodelus* sp.; San Andrés, 997 m (27°47'51"N 18°07'15"O), 3 exx., 3-10-2025, leg. R. Valle, sobre briznas de hierbas en césped de jardín a primera hora (inmaduros). Distribuida por el sur de Europa y norte de África. En Canarias presente en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Primera cita para El Hierro.

Tychius elongatulus Desbrochers des Loges, 1897. Gran Canaria: Andén Verde, Montaña Cerrada, 570 m (28°01'45"N 15°45'58"O), 8 exx., 25-4-2019, leg. A. Machado, bajo *Lotus* sp. y *Ononyx* sp. La Gomera: Puntallana, 40 m (28°07'36"N 17°06'21"O), 1 ex., 16-3-2019, leg. A. Machado, en tamizaje de hojarasca *Euphorbia balsamifera* Aiton. Especie del Mediterráneo meridional conocida de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Primera cita para La Gomera y Gran Canaria.

HISTERIDAE

Acritus nigricornis (Hoffman, 1803). Lanzarote: Haría, altos del Barranco de Malpaso, 579 m (29°08'06"N 13°31'14"O), 1 ex., 6-5-2025, leg. R. García, en tamizaje de suelo a 30 cm de profundidad. Ampliamente distribuido por la región paleártica, abarcando varias zonas de Europa, Asia y norte de África. En Canarias se

conocía de todas las islas excepto Lanzarote, de donde ahora se cita.

HYDROPHILIDAE

Cercyon lateralis (Marshall, 1802). Lanzarote: Haría, Marisma de Órzola, 2 m (29°13'12"N 13°26'47"O), 1 ex., 5-5-2025, leg. A. Machado, en arribazones de algas ya podridas. Fuerteventura: La Oliva, Villaverde, 230 m (28°38'06"N 13°54'21"O), 1 ex., 1-8-2025, leg. R. Valle, atraído mediante trampa de luz. Distribuida por América del norte y Europa llegando hasta Siberia. Conocido de El Hierro. Primera cita para Lanzarote y Fuerteventura.

JACOBSONIIDAE

Derolathrus anophthalmus (Franz, 1969). Lanzarote: Haría, altos del Barranco de Malpaso, 579 m (29°08'06"N 13°31'14"O), 1 ex., 11-5-2025, leg. R. García, en tamizaje de suelo a 30 cm de profundidad. Especie endémica de Canarias, conocida de Gran Canaria y La Palma. Primera cita para Lanzarote.

KATERETIDAE

Brachypterus viridinitens Lindberg, 1950. La Palma: Fuencaliente, El Charco, 716 m (28°32'08"N 17°52'03"O), 2 exx., 1-5-2025, leg. R. García. Breña Baja, Camino el Brezal, 292 m (28°39'02"N 17°46'38"O), 1 ex., 31-1-2026, leg. R. García, ahogado en piscina. Endemismo canario conocido de la islas centrales y orientales. Primera cita para La Palma.

LATRIDIIDAE

Corticaria serrata (Paykull, 1798). La Palma: Garafía, Don Pedro, 500 m (28°50'00"N 17°53'54"O), 1 ex., 25-11-2025, leg. R. García. Originario de Europa ha devenido en cosmopolita por el trasiego de mercancías. En Canarias ha sido citada de El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Primera cita para La Palma.

Dienerella pilifera (Reitter, 1875). Lanzarote: Haría, altos del Barranco de Malpaso, 579 m (29°08'06"N 13°31'14"O), 1 ex., 12-5-2025, leg. R. García, en tamizaje de suelo a 30 cm de profundidad. Especie propia de la cuenca mediterránea. En Canarias se conoce de La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Primera cita para Lanzarote.

MALACHIIDAE

Attalus insuetus Evers, 1960. Montaña Clara: Las Tabaibitas, 69 m (29°17'57"N 13°31'51"O), 6 exx., 26-1-2002, leg. P. Oromí y 3 exx., leg. M. Arechavaleta, sobre *Euphorbia balsamifera*; 1 ex., 26-1-2002, leg. H. López y 1 ex., leg. M. Arechavaleta, sobre *Salsola* sp.; El Veril, 14 m (29°17'30"N 13°31'57"O), 18-12-2001, leg. B. Rodríguez; La Caldera 150 m (29°18'00"N 13°32'00"O aprox.), 1 ex., 15/30-5-2001, leg. B. Rodríguez. Anteriormente citada erróneamente como *Attalus ochraceus* Lindberg, 1950 en Oromí *et al.* (2003). Especie endémica conocida hasta la fecha solamente del macizo de Famara, en el norte de Lanzarote.

Cephalogonia gautardi (Abeille de Perrin, 1881). La Palma: Santa Cruz de La Palma, 60 m (28°41'11"N 17°45'56"O), 1 ex., 4-1-2026, leg. R. García, en pared blanca de edificio. Endemismo canario presente en Gran Canaria. Primera cita para La Palma.

MELYRIDAE

Melyrosoma flavescens Wollaston, 1862. Tenerife: Guía de Isora, Alcalá, Cuevas Negras, 160 m (28°12'51"N 16°49'17"O), 1 ex., 29-5-2021, leg. R. Valle, sobre flor de *Argyranthemum* sp. Especie endémica de Canarias presente en El Hierro, La Palma y La Gomera. Primera cita para Tenerife.

MORDELLIDAE

Mordellistena fernandezi Palm, 1976. Fuerteventura: La Oliva, Villaverde, 230 m (28°38'06"N 13°54'21"O), 3 exx., 1-8-2025, leg. R. Valle, atraídos mediante trampa de luz. Especie endémica conocida de Tenerife y La Palma. Primera cita para Fuerteventura.

NITIDULIDAE

Epuraea imperialis (Reitter, 1877). La Gomera: Agulo, Presa de Meriga, 880 m (28°08'59"N 17°14'21"O), 2 exx., 2-5-2025, leg. R. Valle, tamizando hojarasca de laurisilva. Originaria de Australia e introducida en Nueva Zelanda, España, Canarias, Portugal, Francia, Bélgica e Italia. En Canarias se conocía de Tenerife y La Palma. Primera cita para La Gomera.

Xenostrogylus truncatus Kiesenwetter, 1870. Tenerife: Carretera de Icod a San José de Los Llanos, 900 m (28°21'43"N 16°37'08"O), 1 ex., 21-3-2022, leg. J. Küssner, det. J. Háva. Especie conocida de la península ibérica, Mauritania, Fuerteventura y Lanzarote. Primera cita para Tenerife.

PTILIIDAE

Ptenidium punctatum (Gyll., 1827). La Palma: Breña alta, Unelco, 5 m (28°39'51"N 17°45'59"O), 5 exx., 17-1-2026, leg. R. García, tamizando mantillos de saladillo (*Atriplex semibaccata* R. Br.). Especie referenciada del Paleártico occidental y las islas del Atlántico. Ha sido introducida en América del Norte y en las regiones australiana y oriental. En Canarias se conoce de Lanzarote. Primera cita para La Palma.

PTINIDAE

Hyperisus filicornis (Israelson, 1974). Lanzarote: Caleta de Janubio, 10 m (28°56'18"N 13°49'49"O), 3 exx., 30-3-2025, leg. R. García, emergieron de ramas secas. Endemismo canario conocido de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Montaña Clara. Primera cita para Lanzarote.

Piarus basalis Wollaston, 1862. Tenerife: Arico, Barranco Archipenque, 205 m (28°08'10"N 16°29'22"O), 1 ex., 1-4-2023, leg. A. Machado, en excrementos de conejo en un tabaibal. Endemismo canario conocido de La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. Nueva cita para Tenerife.

STAPHYLINIDAE

Aleochara verna Say, 1836. Tenerife: La Laguna, campo de Golf de Guamasa, 650 m (28°28'54"N 16°22'39"O), 1 ex., 14-5-2024, leg. R. García, en tamizaje de hojarasca variada. Especie ampliamente distribuida por Europa, norte de África, Asia y la región neártica. En Canarias se conocía de El Hierro y Gran Canaria. Primera cita para Tenerife.

Anotylus glareosus (Wollaston, 1854). La Palma: Breña Alta, La Grama, 346 m (28°40'20"N 17°46'47"O), 2 exx., 16-6-1989, y 2 exx., 27-6-2000; Puntagorda, El

Fayal, 763 m (28°46'30"N 17°58'11"O), 1 ex., 16-1-2004, leg. R. García, todas las capturas por tamizaje de hojarasca variada. Especie citada de República Dominicana, la India y Macaronesia. En Canarias se conoce de El Hierro y Tenerife. Primera cita para La Palma.

Astenus dimidiatus (Wollaston, 1864). La Palma: Los Llanos de Aridane, El Remo, 20 m (28°33'07"N 17°53'07"O), 1 ex., 25-1-1991, leg. R. García en tamizaje de hojarasca variada. Endemismo canario presente en El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran




Figura 1-5. Habitus. 1. *Bembidion schmidtii alluaudi* (Antoine, 1925). 2. *Chrysolina americana* Linnaeus, 1758. 3. *Parexochomus troberti troberti* (Mulsant, 1850). 4. *Amaurorhinus bewickianus* (Wollaston, 1860). 5. *Pseudophloeophagus truncorum* (Stephens, 1831). Fotos A. Machado.

Canaria. Primera cita para La Palma.

Atheta misella (Wollaston, 1864). La Gomera: Hermigua, Mirador de Tajaqué, 1300 m (28°06'33"N 17°13'26"O), 2 exx., 24-2-2025, leg. A. Machado. Endemismo canario conocido de El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Primera cita para La Gomera.

Atheta trinotata (Kraatz, 1856). La Palma: Garafía, Roque de los Muchachos, 2340 m (28°45'32"N 17°52'51"O), 1 ex., 4-12-2004, leg. A. Machado; Santa Cruz de La Palma, Fuente de Olén, 1670 m (28°43'53"N 17°48'47"O), 3 exx., 11-7-2006, leg. A. Machado, margen de charco en pinar; Barlovento, Monte del Pueblo, 875 m (28°48'21"N 17°48'53"O), 3 exx., 25-7-2009, leg. A. Machado. Ampliamente distribuida por Europa, norte de África y Asia. En Canarias se conocía de Tenerife. Primera cita para La Palma.

Bledius vitulus Erichson, 1840. Fuerteventura: Puerto del Rosario, Presa los Molinos, 125 m (28°30'37"N 14°01'52"O), 2 exx., 15-1-2020, leg. R. García en la grava de la orilla de la presa. Distribuida por Europa, norte de África y Asia. En Canarias se conocía de Lanzarote. Primera cita para Fuerteventura.

Canariobolitobius filicornis (Wollaston, 1864). La Palma: Breña Alta, La Grama, 342 m (28°40'20"N 17°46'47"O), 1 ex., 29-3-1992; Puntagorda, El Fayal, 763 m (28°46'30"N 17°58'11"O), 1 ex., 28-6-2000; Garafía, Barranco de los Hombres, 40 m (28°49'59"N 17°52'19"O), 1 ex., 20-2-2008. Fuerteventura: Betancuria, Morro Velosa, 660 m (28°26'15"N 14°03'01"O), 1 ex., 27-3-2019; en todos los casos leg. R. García, capturados mediante tamizaje de hojarasca variada. Género monotípico endémico de Canarias, conocido de El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Primera cita para La Palma y Fuerteventura.

Carpelimus bilineatus (Stephens, 1834). Lanzarote: Haría, Presa de Mala, 70 m (29°06'30"N 13°28'34"O), 1 ex., 29-3-2025, leg. R. García, en las escorrentías del fondo del barranco. Ampliamente distribuido por Europa, también se encuentra en Australia, Estados Unidos y Azores. En Canarias se conocía de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Primera cita para Lanzarote.

Carpelimus exiguus (Erichson, 1839). Lanzarote: Haría, Presa de Mala, 70 m (29°06'30"N 13°28'34"O), 1 ex., 6-5-2025, leg. R. García, en la orilla del interior de la presa. Ampliamente distribuido por la región paleártica. En Canarias se conocía de La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Primera cita para Lanzarote.

Carpelimus memnonius (Erichson, 1840). Fuerteventura: Puerto del Rosario, Presa de los Molinos, 125 m (28°30'37"N 14°01'52"O), 1 ex., 15-1-2020, leg. R. García en la grava de la orilla de la presa. Originario de Egipto y Libia, se distribuye por el Mediterráneo occidental. En Canarias se ha referenciado de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Primera cita para Fuerteventura.

Carpelimus rivularis (Motschulsky, 1860). Gran Canaria: Barranco de Azuaje, 240 m (28°06'26"N

15°34'17"O), 1 ex., 12-6-1985, leg. A. Machado, det V. Assing. Ampliamente distribuida por la región paleártica, recientemente citada para Estados Unidos y Canadá. En Canarias se conocía de Tenerife. Primera cita para Gran Canaria.

Carpelimus troglodytes troglodytes (Erichson, 1840). La Gomera: Valle Gran Rey, Charco del Cieno, 3 m (28°05'48"N 17°20'48"O), 1 ex., 6-7-2001, leg. R. García, bajo piedra en las proximidades de la charca. Especie distribuida por Italia, norte de África y Asia. En Canarias se conocía de La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Primera cita para La Gomera.

Coproporus pulchellus (Erichson, 1839). El Hierro: Frontera, Camino de Jinama, 310 m (27°45'14"N 17°59'25"O), 1 ex., 4-12-2008, leg. R. García, en tamizaje de hojarasca variada. Especie distribuida por las regiones neártica y neotropical, Azores y Canarias, de donde ha sido referenciada de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Primera cita para El Hierro.

Euconnus campestris (Schaufuss, 1866). La Gomera: Agulo, Las Rosas, 675 m (28°11'15"N 17°13'36"O), 3 exx., 1-5-2025, leg. R. Valle, en tamizaje vegetal variado; Agulo, Presa de Meriga, 880 m (28°08'59"N 17°14'21"O), 6 exx., 2-5-2025, leg. R. Valle, tamizando hojarasca de laurisilva. Especie neotropical introducida en el norte de África, Europa, Madeira y Azores. En Canarias se conocía de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Nueva cita para La Gomera.

Mycetoporus christinae Palm, 1975. Fuerteventura: Pájara, Pico de la Zarza, 750 m (28°06'52"N 14°21'23"O), 1 ex., 25-2-2019; Betancuria, Morro Velosa, 660 m (28°26'15"N 14°03'01"O), 2 exx., 27-3-2019, leg. R. García, en ambos casos en tamizaje de hojarasca. Endemismo canario descrito de Lanzarote. Primera cita para Fuerteventura.

Mycetoporus nigricollis (Stephens, 1835). Gran Canaria: Gáldar, Agazal, 325 m (28°06'45"N 15°39'34"O), 1 ex., 24-4-2019, leg. R. García, bajo piedra. Ampliamente distribuido por Europa. En Canarias se conocía de La Palma. Primera cita para Gran Canaria.

Omalius ocellatum Wollaston, 1854. La Palma: Breña Baja, Pared Vieja, 1199 m (28°37'10"N 17°49'22"O), 1 ex., 14-7-1987, leg. R. García; Villa de Mazo, Las Toscas, 581 m (28°36'20"N 17°46'59"O), 2 exx., 13-1-2006, leg. R. García, en ambos casos mediante tamizaje de hojarasca variada. Endemismo macaronésico. En Canarias se conocía de El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Primera cita para La Palma.

Outachyusa raptoria (Wollaston, 1854). Gran Canaria: Artenara, Presa de los Pérez, 820 m (28°02'45"N 15°39'56"O), 1 ex., 21-6-1985, leg. A. Machado, det V. Assing. Especie propia del Mediterráneo occidental, en Canarias conocida de La Palma y Tenerife. Primera cita para Gran Canaria.

Paraphloeostiba gayndahensis (MacLey, 1873). Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, Parque García Sanabria, 41 m (28°28'19"N 16°15'11"O), 1 ex., 10-7-

2016, leg. R. García, en tamizaje de hojarasca. Originaria de Australia, su carácter antrópico la ha convertido prácticamente en cosmopolita. En Canarias se conocía de La Palma, La Gomera y Fuerteventura. Primera cita para Tenerife.

Platystethus alutaceus (Thomson, 1861). Gran Canaria: Mogán, Presa Salto del Perro, 903 m (27°54'20"N 15°41'06"O), 1 ex., 23-3-2022, leg. R. García, bajo piedra. Especie de distribución paleártica, en Canarias conocida de Tenerife. Primera cita para Gran Canaria.

Remus sericeus Holme, 1837. El Hierro: Valverde, Playa Timijirque, 1 m (27°46'13"N 17°54'52"O), 2 exx., 10-6-2004, leg. P. Oromí (det. V. Assing). Especie mediterránea conocida de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, pero que ha sido atribuida a *R. pruinosus* (Erichson, 1840) en los últimos catálogos (especie también presente en Canarias, al menos en La Palma, Tenerife y Lanzarote). Nueva cita para El Hierro.

Stenichus thytonus thytonus Reitter, 1884. La Palma: Mazo, Lomo Oscuro, 540 m (28°34'51"N 17°46'54"O), 1 ex., 24-8-2021, leg. R. Valle, en tamizaje de restos vegetales en descomposición. Distribuido en España, Francia, Portugal y Marruecos. En Canarias se conocía de Tenerife y Gran Canaria. Primera cita para La Palma.

Sunius brevipennis canariensis (Bernh., 1928). Fuerteventura: Betancuria, Morro Velosa, 660 m (28°26'15"N 14°03'01"O), 2 exx., 27-3-2019, leg. R. García, en tamizaje de hojarasca. Endemismo canario conocido de El Hierro, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote. Primera cita para Fuerteventura.

Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758). La Palma: Laguna de Barlovento, 742 m (28°48'48"N 17°48'18"O), 4 exx., 8-7-2009, leg. R. García, en tamizaje variado. Especie prácticamente cosmopolita. En Canarias se conocía de Tenerife. Primera cita para La Palma.

Xantholinus linearis linearis (Olivier, 1794). Tenerife: El Sauzal, Área recreativa de Fuente Fría, 1400 m (28°25'13"N 16°24'35"O), 1 ex., 13-1-2008, leg. R. García, bajo piedra. Especie de distribución paleártica. En Canarias se conocía de Gran Canaria. Primera cita para Tenerife.

TENEBRIONIDAE

Myrmechixenus vaporariorum (Guérin-Meneville, 1843). La Palma: Casas de Taburiente, 763 m (28°43'33"N 17°52'29"O), 1 ex., 31-8-1999, leg. R. García en tamizaje de compostera. De origen mediterráneo, ocupa territorios eurosiberianos y de Oriente Medio, aunque hoy se considera de amplia distribución mundial. En Canarias se conocía de Tenerife. Primera cita para La Palma.

Nesotes rimosus (Wollaston, 1864). Fuerteventura: La Oliva, Morro Tabaiba, 360 m (28°35'22"N 13°56'45"O), 1 ex., 3-1-2020, leg. R. Valle, en tamizaje de tabaibas; La Oliva, Tindaya, 145 m (28°36'09"N 13°58'45"O), 3 exx., 3-2-2020, leg. R. Valle, en tamizaje de hojarasca de *Ficus carica* L.; Betancuria, Morro Velosa, 575 m (28°26'21"N 14°03'15"O), 2 exx., 3-2-2020, leg. R. Valle, bajo piedras; Betancuria, Barranco de Palomares, 320 m (28°24'13"N 14°03'37"O), 2 exx., 3-2-2020, leg. R. Valle, bajo piedras. Especie endémica de Fuerteventura sin menciones posteriores a su descripción.

Melansis reyesi García & Oromí, 2000. Tenerife: Güímar, base de Montaña Grande, 115 m (28°18'55"N 16°22'50"O), 10 exx., 18-1-2026 y 30-1-2026, leg. R. Valle; 1 ex., 20-1-2026, leg. A. Machado, colectados bajo piedras pequeñas en tabaibal. Antes de la descripción de esta especie endémica mediante material procedente de Anaga, se conocía un resto subfósil encontrado en una excavación arqueológica de Barranco Hondo. Estas colectas constatan la presencia de esta rara especie fuera de su localidad típica.

Agradecimientos

Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de Canarias y cabildos insulares por los permisos de colecta emitidos a lo largo de estos últimos años, así como a los colegas que han cedido sus datos o colaborado identificando algunas especies: Jan Pelikán (Hradec Králové, República Checa), Heriberto López (La Laguna, Tenerife), Jiří Háva (Praga, República Checa) y Tomasz Klejdysz (Poznań, Polonia).

Referencias

- Alonso-Zarazaga, M. A., Barrios, H., Borovec, R., Bouchard, P., Caldara, R., Colonnelli, E., Gültekin, L., Hlavác, P., Korotyaev, B. A., Lyal, C. H. C., Machado, A., Meregalli, M., Pierotti, H., Ren, L., Sánchez-Ruiz, M., Sforzi, A., Silfverberg, H., Skuhrovec, J., Trýzna, A. J., Velázquez De Castro, A. J. & Yunakov, N. 2023. Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. *Monografías electrónicas de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **14**: 780.
- Banco del Inventario Natural de Canarias 2026. <https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/especies>
- Borges, P. A. V., Abreu, C., Aguiar, A.M.F., Carvalho, P., Fontinha, S., Jardim, R., Melo, I., Oliveira, P., Sequeira, M.M., Sérgio, C., Serrano, A.R.M., Sim-Sim, M. & Vieira, P. 2008. *Terrestrial and freshwater biodiversity of the Madeira and Selvagens archipelagos*. In: Borges, P. A. V., C. Abreu, A. M. F. Aguiar, P. Carvalho, R. Jardim, I. Melo, P. Oliveira, C. Sérgio, A. R. M. Serrano & P. Vieira (eds.). A list of the terrestrial fungi, flora and fauna of Madeira and Selvagens archipelagos. pp.13-25, Direcção Regional do Ambiente da Madeira and Universidade dos Açores, Funchal and Angra do Heroísmo.
- Brullé, G. A. 1839. Insectes. In: Webb P. B. & Berthelot S. (eds.). *Histoire Naturelle des îles Canaries (1836-1844)*. Bethune. Paris: Pp. 54-95.
- García, R. 1986. Nuevos datos sobre la distribución de la fauna coleopterológica de Canarias. *Vieraea*, **16**: 73-79.

- García, R. 1991. Nuevos datos para el catálogo de los coleópteros de Canarias. *Vieraea*, **20**: 203-211.
- García, R. 2003. Coleópteros. Nuevos datos sobre la distribución en el archipiélago canario. *Zoras, revista asociada de la UNED*, **6**: 29-36.
- García, R. 2009. Nuevos datos de distribución de coleópteros en el archipiélago canario. *Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma*, **4**: 145-152.
- García, R., García, J. & Sicilia, P. 2016. Nuevas aportaciones al elenco de coleópteros (Insecta: Coleoptera) de Canarias. *Revista de la Academia Canaria de las Ciencias*, **28**: 79-88.
- García, R. & Pedrianes, J.M. 2021. Un nuevo escarabajo ambrosía introducido en las islas Canarias (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). *Revista de la Academia Canaria de Ciencias*, **32**: 9-12 (enero de 2021).
- García, R., Valle, R., Machado, A. & Oromí, P. 2024. Nuevas Citas de Coleópteros para Canarias. *Revista de la Academia Canaria de las Ciencias*, **35**: 51-76.
- García, R., Valle, R., Machado, A. & Oromí, P. 2025. Nuevas Citas de Coleópteros para Canarias (II). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)*, **76**: 37-46.
- Israelson, G., Machado, A., Oromí, P. & Palm, T. 1982. Novedades para la fauna coleopterológica de las Islas Canarias. *Vieraea*, **11**(1-2): 109-134.
- Lompe, A. 2023. Käfer Europas. Gattung *Hylastes* Erichson. <https://coleonet.de/cole/texte/hylastes.htm>
- Machado, A. 2006. El sarantontón asiático *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) presente en Canarias (Coleoptera: Coccinellidae). *Vieraea* **34**: 71-72.
- Machado, A. 2014. Some additions and corrections to the Coleoptera fauna of the Canary Islands. *Graellsia*, **70**(1): 1-4.
- Machado, A. & García, R. 2019. Dos nuevos gorgojos introducidos en las islas Canarias (Coleoptera, Curculionidae). *Vieraea*, **44**: 391-402.
- Machado, A. & Oromí, P. 2000. *Elenco de los Coleópteros de las islas Canarias*. Monografía LXX. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna, 306 pp.
- Machado, A. 2026. Claves de los coleópteros de Canarias. www.antoniomachado.net/es/actividades/entomologia/identification-keys-canary-islands-coleoptera/
- Oromí, P. 1984. Nuevas aportaciones al conocimiento de la distribución de los coleópteros de Canarias. *Vieraea*, **13** (1-2): 233-240.
- Oromí, P., de la Cruz, S. & Báez, M. 2010. Coleoptera. En: *Lista de especies silvestres de Canarias. Hongos, plantas y animales terrestres*. 2009. Arechavaleta, M., S. Rodríguez, N. Zurita & A. García (coords.). Gobierno de Canarias: 254-301.
- Oromí, P. & García, R. 1995. Contribución al conocimiento de la fauna de coleópteros de Canarias y su distribución. *Vieraea*, **24**: 175-186.
- Oromí, P., López, H., Arechavaleta, M., Contreras, H.G. & Rodríguez, B. 2003. Fauna de artrópodos de Montaña Clara (Islas Canarias) I: Coleópteros. *Vieraea*, **31**: 167-182.
- Osella, G. 1991. The zoogeographical significance of Curculionid fauna in the islands of the Central and Southern Atlantic Ocean. *Accademia Nazionale dei Lincei, Atti dei Convegni Lincei*, Roma, **85**: 773-786.